

# Equação quadrática

Prof. Doherty Andrade

Resumo: Nestas notas faremos um breve estudo sobre as principais propriedades das funções quadráticas: existência de raízes, valores máximos e mínimos, gráficos e algumas aplicações simples.

## Sumário

1	Objetivo	1
2	Fórmula quadrática	1
3	Analisando o discriminante	3
4	Relação entre os coeficientes e as raízes	4
5	Gráficos	6
6	Aplicação	7
7	Equações relacionadas a equações quadráticas	7

## 1 Objetivo

Estudar funções definidas por equações da forma

$$y = ax^2 + bx + c, a \neq 0.$$

## 2 Fórmula quadrática

Suponha que temos que resolver uma equação do segundo grau

$$ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0.$$

Toda equação quadrática pode ser resolvida usando o método de completar quadrados. Vejamos como completar quadrados.

Dividindo essa equação por  $a$ , obtemos

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0.$$

Ou equivalentemente,

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}. \quad (2.1)$$

Somando  $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$  a ambos os lados de equação (2.1), temos

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 \quad (2.2)$$

Note que o lado esquerdo da igualdade acima é um quadrado perfeito e pode ser escrito como

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}. \quad (2.3)$$

Extraindo a raiz de ambos os lados, temos

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}} = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}. \quad (2.4)$$

Assim,

$$x = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}. \quad (2.5)$$

Logo, as soluções da equação quadrática  $ax^2 + bx + c = 0$ ,  $a \neq 0$ , são dadas pela seguinte fórmula chamada de fórmula quadrática:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}. \quad (2.6)$$

Exemplo: Resolver a equação  $2x^2 - 3x + 5 = 0$ . Para isso vamos usar a fórmula quadrática equação (2.6):

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Comparando com  $ax^2 + bx + c = 0$ ,  $a \neq 0$  obtemos que

$$\begin{aligned} a &= 2 \\ b &= -3 \\ c &= 5. \end{aligned}$$

Substituindo na fórmula quadrática temos

$$\begin{aligned} x &= \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \times 2 \times 5}}{2 \times 2} \\ &= \frac{3 \pm \sqrt{9 - 40}}{4} \\ &= \frac{3 \pm i\sqrt{31}}{4}. \end{aligned}$$

Logo, o conjunto solução é

$$\left\{ \frac{3 + i\sqrt{31}}{4}, \frac{3 - i\sqrt{31}}{4} \right\}$$

### 3 Analisando o discriminante

Já vimos que a fórmula quadrática dá as soluções de  $ax^2 + bx + c = 0$ ,  $a \neq 0$ , como

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Se chamarmos  $D = b^2 - 4ac$  (discriminante), as duas raízes podem ser expressas por

$$\begin{aligned} r_1 &= \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} \\ r_2 &= \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}. \end{aligned}$$

Note que pela expressão acima a natureza das raízes depende apenas do sinal de  $D$ .

Vamos apresentar alguns exemplos e observar a relação entre  $D$  e a natureza das raízes.

Exemplos:

(a) A equação  $x^2 - 4x + 1 = 0$  tem  $D = 12 > 0$  e as raízes são

$$\begin{aligned} r_1 &= 2 + \sqrt{3} \\ r_2 &= 2 - \sqrt{3}. \end{aligned}$$

Nesse exemplo, temos  $D > 0$  e as duas raízes são reais e diferentes.

(b) A equação  $x^2 - 4x + 4 = 0$  tem  $D = 0$  e as duas raízes são

$$\begin{aligned}r_1 &= 2 \\r_2 &= 2.\end{aligned}$$

Nesse exemplo, temos  $D = 0$  e as duas raízes são reais e iguais.

(c) A equação  $x^2 - 4x + 5 = 0$  tem  $D = -4 < 0$  e as duas raízes são

$$\begin{aligned}r_1 &= 2 + i \\r_2 &= 2 - i.\end{aligned}$$

Nesse exemplo, temos  $D < 0$  e as duas raízes são complexas e conjugadas.

Resumo:

Podemos resumir as observações como:

- Se  $D > 0$ , então as duas raízes são reais e diferentes.
- Se  $D = 0$ , então as duas raízes são reais e iguais.
- Se  $D < 0$ , então as duas raízes são complexas e conjugadas.

## 4 Relação entre os coeficientes e as raízes

Vimos que as raízes de  $ax^2 + bx + c = 0$ ,  $a \neq 0$  podem ser expressas por

$$\begin{aligned}r_1 &= \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} \\r_2 &= \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}.\end{aligned}$$

assim, somando as duas raízes obtemos:

$$\begin{aligned}r_1 + r_2 &= \left( \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} \right) + \left( \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} \right) \\&= \frac{-b}{a}.\end{aligned}$$

e multiplicando as duas raízes

$$\begin{aligned}
 r_1 r_2 &= \left( \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} \right) \times \left( \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} \right) \\
 &= \frac{b^2 - D}{4a^2} \\
 &= \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} = \frac{c}{a}.
 \end{aligned}$$

Segue que

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0.$$

pode ser expressa como

$$x^2 - (r_1 + r_2)x + r_1 r_2 = 0.$$

ou

$$a(x - r_1)(x - r_2) = 0.$$

Exemplos

(a) Determine se  $r_1 = \frac{5+\sqrt{17}}{4}$  e  $r_2 = \frac{5-\sqrt{17}}{4}$  são soluções da equação  $2x^2 - 5x + 1 = 0$ .

Podemos escrever a equação como  $x^2 - \frac{5}{2}x + \frac{1}{2} = 0$ . Assim, devemos ter  $r_1 + r_2 = \left( \frac{5+\sqrt{17}}{4} \right) + \left( \frac{5-\sqrt{17}}{4} \right) = \frac{5}{2} = \frac{-b}{a}$ .

Por outro lado  $r_1 r_2 = \left( \frac{5+\sqrt{17}}{4} \right) \times \left( \frac{5-\sqrt{17}}{4} \right) = \frac{25-17}{16} = \frac{25-17}{16} = \frac{8}{16} = \frac{1}{2} = \frac{c}{a}$ . Segue que  $r_1$  e  $r_2$  são soluções da equação  $2x^2 - 5x + 1 = 0$ .

(b) Determine dois números cuja soma e 8 e o produto e 15.

Sabemos que os dois números  $r_1$  e  $r_2$  devem satisfazer à seguinte equação

$$x^2 - (r_1 + r_2)x + r_1 r_2 = 0.$$

Ou seja

$$x^2 - (8)x + 15 = 0.$$

Usando a formula quadrática, obtemos

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{-(-8) \pm \sqrt{(-8)^2 - 4 \times 1 \times 15}}{2 \times 2} \\
 &= \frac{8 \pm \sqrt{64 - 60}}{2} \\
 &= \frac{8 \pm \sqrt{4}}{2} = 4 \pm 1.
 \end{aligned}$$

Assim, os números são  $r_1 = 3$  e  $r_2 = 5$ .

## 5 Gráficos


A equação quadrática  $y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ , pode ser reescrita como

$$y = a(x - h)^2 + k,$$

onde  $h = \left(\frac{-b}{2a}\right)$  e  $k = \left(\frac{-D}{4a}\right)$ .


Você pode verificar isso facilmente completando quadrados como já fizemos anteriormente.

O gráfico de  $y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ , é uma parábola com vértice no ponto  $V = (h, k)$  e a reta vertical  $x = h$  é a reta de simetria.



Note que se  $a > 0$  o vértice é o ponto do gráfico que está situado mais baixo (chamado de ponto de mínimo global). Também dizemos que a parábola se abre para cima. Veja o gráfico abaixo.

E se  $a < 0$  o vértice é o ponto do gráfico que está situado mais alto (chamado de ponto de máximo global). Também dizemos que a parábola se abre para baixo. Veja o gráfico abaixo.



Exemplos

(a) A parábola  $y = -2(x - 2)^2 + 6$  tem eixo de simetria dado pela reta vertical  $x = 2$  e vértice  $V = (2, 6)$ . Como  $a = -2 < 0$  o seu gráfico se abre para baixo. Selecione e marque alguns pontos para auxiliar no traçado do gráfico.

(b) A parábola  $y = (x - 1)^2 + 2$  tem eixo de simetria dado pela reta vertical  $x = 1$  e vértice  $V = (1, 2)$ . Como  $a = 1 > 0$  o seu gráfico se abre para cima. Selecione e marque alguns pontos para auxiliar no traçado do gráfico.

## 6 Aplicação

Considere o seguinte problema: determinar as dimensões da região retangular de maior área possível que tem perímetro igual a 20 metros.

Inicialmente, vamos chamar as dimensões do retângulo de  $x$  e  $y$ . Assim, o seu perímetro é  $x + y = 20$  e sua área é  $xy$ . Como  $y = 20 - x$  segue que a área  $A(x) = x(20 - x)$  pode ser escrita como

$$A(x) = -(x - 10)^2 + 100.$$

Esta é uma parábola que se abre para baixo e portanto, tem o seu máximo global no vértice cujo ponto é  $V(10, 100)$ .

Segue que  $x = 10$  e  $y = 20 - 10 = 10$  são as dimensões do retângulo e portanto, o retângulo é um quadrado cujo lado mede 10 metros. A sua área é de 100 metros quadrados.

## 7 Equações relacionadas a equações quadráticas

Uma equação radical é uma equação tendo uma variável no radicando. Por exemplo,

$$\sqrt{x + 1} = 3.$$

Podemos resolver essa equação elevando ambos os lados ao quadrado, obtendo

$$x + 1 = 9.$$

Segue que  $x = 8$ . Substituindo  $x = 8$  na equação  $\sqrt{x+1} = 3$  vemos que  $x = 8$  é de fato solução.

Outro exemplo é a equação  $\sqrt{x+4} + 8 = x$ . Reescrevendo como  $\sqrt{x+4} = x - 8$  e elevando ao quadrado ambos os lados obtemos,

$$x + 4 = (x - 8)^2.$$

O que resulta em

$$x^2 - 17x + 60 = 0,$$

cujas soluções são  $x = 5$  e  $x = 12$ .

Substituindo esses valores na equação radical  $\sqrt{x+4} + 8 = x$  vemos que apenas  $x = 12$  é uma solução.

## Referências

- [1] L. Childs, A concrete introduction to higher algebra. Springer-Verlag, New York, 1979.